




# ยาและสารเสพติดที่แพร่ระบาดในประเทศไทย

## ยาเสพติดธรรมชาติ

### ฝิ่น (Opium)

ฝิ่นเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง ขึ้นในบริเวณที่สูงที่มีอากาศหนาวเย็น ผลฝิ่นเมื่อใช้มีดคัตจะได้ยางฝิ่น มีลักษณะเป็นสีขาวขัน เม็ดถูกอกออก จะมีสีคล้ำลงกลายเป็นยางเหนียว สีน้ำตาลเหลืองหรือเขียว มีกลิ่นเหม็นบitter รอม ฝิ่นมีกรดอินทรีย์ ประเกอห้อคลาลอยด์ (Alkaloid) มีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ส่วนกลาง ทำให้เกิดอาการเคลิบเคลี้ม สมองทำงานช้าลง จ่วง เสียงซึ้ง ใจลอย กดหัวใจ慢 เพด กดภูมิคุ้มกันของ ร่างกายทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย



### กัญชา (Cannabis)

กัญชาเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 2-4 ฟุต ในแต่ละปีจะออก 5-8 แฉกคล้ายใบมันล่าง平淡 ส่วนที่นำมาเล่น ได้แก่ กิ่ง ก้าน ใบ และยอดซื้อขายกัญชา

กัญชา มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC จะเริ่มออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ทำให้ตื่นตัว ตกใจง่าย ตื่นมากจากประสาท ทำให้หื่นซึ้งและจ่วงนอน แล้วจะหลอน ประสาททำให้เห็นภาพหลวงตา หูว่า ความคิดลับลับ ควบคุมตัวเองไม่ได้



## ยาเสพติดสังเคราะห์

### เอโรอีน (Heroin)

เอโรอีน เป็นผลิตภัณฑ์ข้าว หรือพบในลักษณะอัดเป็น ก้อนสีเหลืองผิวผ้า ไม่มีกลิ่น มีรสเผ็ดจัด เอโรอีนในประเทศไทย มีการผลิตอาหานุ ลูตริกิน (Strichnine) ยานอนหลับ กานพลู แมง น้ำตาล ด้วยเอโรอีนออกฤทธิ์กระตุ้นประสาทส่วนกลางทำให้ เคลิบเคลี้ม สมองฟื้นชา ลดปัญญา เชื่อว่า จ่วงหลับโดยไม่รู้ตัว ผู้ช่วยว่า ารมณ์ เมื่อยนแปลงง่าย หากเล่นเกินขนาดอาจถึงแก่ความตายได้และหากไม่ได้ เล่นจะมีอาการขาดหายใจแรง ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว ห้องเดิน อาเจียน รายที่รุนแรงมากอาจถ่ายเป็นเลือดที่ขาบ้านเรียกว่า ลงแดง



### กระท่อม (Kratom)

กระท่อมเป็นพืชยืนต้นขนาดกลาง ในคล้าย กระท่อมหรือรัง ในป่าบูน มีการนำกระท่อม มาผลิตกับล้วนผลิตต่างๆ แล้วเรียกว่าต่างไป เช่น ลีคุนร้อย เป็นต้น ในกระท่อมมีสารไมตรากinin (Mitragynine) ที่ออกฤทธิ์ทึบกระท่อม ประสาทและกดประสาท ทำให้มีชีว่า ควบคุมคลื่นเสียงได้ ผ้าหันนังใหม่เกรียน เนื่องจากไม่มีความรู้สึกเวลา dolore แต่



### สารระเหย (Inhalant)

สารระเหยเป็นของเหลว ล้ำมากจะใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเฉพาะตัว มีสารประกอบสำคัญ คือ โทลูอีน (Toluene) ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ในระยะเรียบผ่อนคลายให้ตื่นเต้น มีนามคallyเมาก่อรุ่รา หมุดจ้าวแอ้มไว้ชัก ไม่รู้เวลาลักษณ์ที่ควบคุม ตนเองไม่ได้ ในระยะยาวมีอาการ ทางจิต ค้าร้าว หมุก อุดตันกระเพาะ และ อุบัติสัญญา บีบหัวใจ เกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ปอดอักเสบ ตับและ ไตล้มเหลว และ ที่ร้ายแรงที่สุด คือ เชลล์ของถูกกระตุ้นทำให้หูดีดีชัก มือแขนขาลืม เดินไม่ตรงทาง นับเป็นความพิการอันเกิดจากสารระเหย



### ยาบ้า (Mathamphetamine)

ยาบ้า เป็นยาเม็ดกลมแบบขนาดเล็ก เลี้นผ่าตุ้นเบี้ยกลาง 6-8 มิลลิเมตร ความหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร มีสีต่างๆ กัน เช่น สีลม สีน้ำตาล สีม่วง สีชมพู สีเทา สีเหลือง และสีเขียว มีกลิ่นสูญกลิ่นพราวๆ อยู่บนเม็ดยา ได้แก่ 1A, M, TG, WY, R, 99 เป็นต้น ในยาบ้าประกอบด้วย เมามะเฝาโนซีน ที่ออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท ในระยะแรกจะทำให้ร่างกายตื่นตัว หัวใจเต้นเร็วความดัน โลหิตสูง ใจสั่น ประสาททึงเครียด แต่เมื่อหมดฤทธิ์จะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดบ่อยเหตุ ร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อ กันเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการประสาทหลอน หัวใจเต้นแรง หัวใจเต้นเร็ว คลื่นคลัง ขาจ้าร้ายดูดมองและผู้อื่นได้

### ยาอี (Ecstasy)


ยาอีเป็นยาลักษณะเดียวกับยาอีคีซี (ecstasy) มีลักษณะเป็นเม็ดและแคปซูล ลักษณะใหญ่ๆ มีลักษณะ เป็นเม็ดกลมแบน หาด 0.3-0.4 ชั่วโมง หลังผ่าน ศูนย์กลาง 0.8-1.2 ชั่วโมง ผู้ใช้เรียกคำค้นหนึ่ง พิมพ์เป็นรูปภาคต่างๆ เช่น ไฟล์ กระด่าย (play boy) หรือรูปที่เป็น โลโก้ของสินค้า เช่น ห้อดัง, หรือพิมพ์เป็นตัวอักษร เช่น CU, OK



ยาอีออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท หลังจากนั้นจะหลอน ประสาทอย่างรุนแรง ทำให้หัวร้าว หัวใจเต้นเร็ว ความต้องเสียดสูง การใช้จิบและการมองเห็น แสงสีต่างๆ ดีไปจากความเป็นจริง เคลิบเคลี้ม ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ ในระยะยาวสามารถทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ล่งผลให้ผู้เสียหายต้องเสียดสูง ใจจดจ่อ หล่อหลอมของล้วนที่ทำ หน้าที่ในการควบคุมอารมณ์ ทำให้เกิดโรคเรื้อรังและมีแนวโน้ม การม่วงด้วยสูงกว่าคนปกติ

### ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine)

ยาเค หรือเคตามีน (Ketamine) หรือ เดคาวา (Ketava) หรือเดคาลา (Ketalar) ใช้ใน การรักษาทางการแพทย์เป็นยาสลบในกรณีของการผ่าตัดที่ใช้ ระยะเวลาสั้น หรือใช้ทำให้ผู้ป่วยสลบก่อนที่จะผ่านไปสู่ยาสลบ ชนิดอื่น มีลักษณะเป็นสีขาว และน้ำบรูดูรูปไข่ในขวดสีเขียว เดคากีน หลอนประสาทอย่างรุนแรงทำให้เคลิบเคลี้ม สรุญเสียกระบวนการ กางความติด ลับลับ การรับรู้ การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม หัวใจ แสง สี เสียง จะเปลี่ยนแปลงไป ตามกาย ร่างกายเคลื่อนไหว ไม่สัมผัสรู้ถูก หากใช้บ่อยริมทางมากจะเกิดอาการหายใจลำบาก และหากใช้ติดต่อ กันเป็นเวลาหนาแน่นก็จะเกิดอาการหายใจลำบากต่อ



### ไอซ์ (Ice)

ไอซ์ คือ เมาแอมเฟตามีน ในรูปหลักใช้ออกฤทธิ์ กระตุ้นระบบประสาท เช่นเดียวกับยาบ้า แต่มีความรุนแรงกว่าและเป็นอันตรายมากกว่า (หัวขอ ยาบ้า)